



د تخصصي درملني له لارې د امیندواری پرمهال شکر ناروغي تعقیب

تاسي د مورني خانگي کي د اورل گلوکوز د زغم معاینات ترسره کړي دي. ستاسي د گلوکوز (شوگر) سطح د نورمال څخه لوړه وه، دا دي څرگندونه کوي چي تاسي د امیندواری پرمهال شکر لرئ. د گلوکوز لوړه سطح ستاسي او ستاسي د ماشوم روغتيا باندې اغیزه درلودلی شي، نو د همدې لپاره باید درملنه يې وشي. اوس به تاسي د لانورو معایناتو او درملني لپاره روغتون ته راجع کړی شئ.

په 2015 کي د سوېډن د روغتيا ملي ادارې د امیندواری پرمهال شکر ناروغي د تشخیص لپاره د نوي (ټيټ) گلوکوز درشل وړاندیز کړی دی. وړاندیز د کيبلري ويني بیلگه اخیستلو (د گوتي لرگي) چي ډیر معتبر ندی، پرځای د رگ له لارې د ويني بیلگي اخیستلو (په ځنگل کي د مټ په قات کي د نري کټیتر په کارولو سره) پر اساس دی. د نوي درشل معرفي کول به د هغه میرمنو د شمیر ډیروالي پایله ولري چي د امیندواری پرمهال شکر ناروغي پکي تشخیص کيږي، مگر د روغتيا لپاره پېچلتياوي يې لا هم روښانه نه وي. د نوي درشل هرډول رسمي معرفي کولو څخه مخکي به د مور او د هغي د ماشوم روغتيا باندې د دي اغيزي په ټول هیواد کي وارزول شي چي په سپټمبر 2017 کي دغه ارزونه پیليري. ارزونه کي به سکان (Skåne) کي، په کریستیانستاد (Kristianstad)، لنډ (Lund) او ملمو (Malmö) کي روغتونونه برخه واخلي. که تاسي د دغه روغتونونو څخه کوم یوه ته راجع شوی، نو تاسي ته به د رگ له لارې د ويني اخیستلو په واسطه د اورل گلوکوز د زغم نوي معاینې وړاندیز وشي ترڅو د نور تعقیب او درملني پشمول د امیندواری پرمهال د شکر ناروغي تشخیص تایید شي.

په لاندې روغتونونو کي متخصص ډاکټران

Skånes universitetssjukvård او Kunskapscentrum kvinnohälsa

کرین هالستیډ (Karin Hallstedt)

کرستین برنتارپ (Kerstin Berntorp)

هیلینا سټریوینس (Helena Strevens)